

Eyeliss

Activo para el contorno de ojos · Sederma

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Contenido de este documento


- | | |
|--|--------|
| 1. Ficha técnica e información de producto | pág. 2 |
| 2. Información de efectividad | pág. 4 |

LTSH S.A. de C.V.

ltsh.com.mx · info@ltsh.com.mx



EYELISS™



Formación de edema

Función:

Ayuda a prevenir y combatir las bolsas debajo de los ojos.

Definición:

Combinación de tres moléculas de activos en solución: hesperidina metil chalcona, dipéptido VW y lipopéptido Pal-GQPR.

Propiedades:

Hesperidina metil chalcona:

Disminuye la permeabilidad capilar.

Dipéptido valil-triptófano (VW):

Aumenta la circulación linfática

Lipopéptido Pal-GQPR:

Mejora la firmeza y la elasticidad, disminuye el fenómeno de inflamación.

Características:

Gracias a la asociación de estos tres activos, Eyeliss™ representa un acercamiento global para el tratamiento de los ojos hinchados actuando sobre las deficiencias fisiológicas.

Nombre INCI:

Aqua (Water) – Glycerin – Hesperidin
Methyl Chalcone – Steareth-20 –
Dipeptide-2 – Palmitoyl Tetrapeptide-7

Aplicaciones:

En todos los productos (cremas, geles, lociones,...) para el tratamiento de ojos hinchados.

Formulación:

Soluble en agua. Se incorpora a 45°C en emulsiones o a temperatura ambiente en geles.

Dosis de uso recomendada: 3 %

Patente:

WO 03/068141 – FR 2 836 042 –
EP 1 474 100 – US 7,998,493 –
JP 3730603



2-0024-06-100-00



www.sederma.com/sp

E-mail: seiderma@seiderma.fr

Copyright© 1994-2018 Sederma

Reservados todos los derechos.

Miembro del Grupo Internacional Croda


Tratamiento para **bolsas**

Sólo para sus **ojos**


Mejora comprobada en el

70%


de los voluntarios



Antes




Después




Antes



Después



Antes



Después

Pruebas *in vitro*

● Efecto anti-inflamatorio del péptido Pal-GQPR

Regulación de la IL6 inducida por rayos UV, producida por queratinocitos

● -33% con 3 % Eyeliss™

● Estimulación de drenaje con el dipéptido VW

Inhibición de la enzima Angiotensin Converting (ACE)

● 85% con 1 % Eyeliss™

Pruebas *ex vivo*

● Efecto de la hesperidina metil chalcona sobre la permeabilidad capilar

● -25% de permeabilidad capilar

Estudio Clínico

20 mujeres voluntarias, de edad entre 40 y 60 años, que presentan bolsas crónicas debajo de sus ojos.

Dos aplicaciones diarias durante 56 días de un gel conteniendo 3 % de EYELISS™.

Medidas morfométricas 3D a 0, 28 y 56 días.


● Estudio morfométrico

Resultados significativos	T28	T56
Disminución significativa del espesor de la bolsa (en mm)	-0,08	-0,20
Valor máximo (en mm)	-0,40	-0,69
Número de voluntarios con una reducción en el volumen de la bolsa	65%	70%

● Autoevaluación

Suavidad alrededor del ojo	62%
Reducción en las bolsas	52%
Efecto descongestivo	52%

Principio del estudio de morfometría 3D




El software mide las distancias entre la superficie de la bolsa antes del tratamiento y la superficie de la bolsa después del mismo.

Antes



Después



Formulación

Gel para ojos hinchados con EYELISS™ Fórmula ref.: SED0107234D

Parte A%	
Agua desionizada	qs 100
Ultrez 10 (Carbomer)	0,20
Parte B%	
Glicerina	5,00
Conservantes	qs
Parte C%	
Hidroxietil celulosa	0,20
Parte D%	
Pemulen TR2 (Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Lubrizol)	0,20
Crodamol CAP (Cetearyl Ethylhexanoate, Croda)	6,00
Parte E%	
Sorbato potásico	0,10

No-garantía: Esta formulación ha sido sometida a pruebas de estabilidad limitadas, las cuales dieron resultados satisfactorios. Sin embargo, aquellos formuladores que adopten dicho método han de satisfacer ellos mismos, sus propias exigencias de estabilidad. Se recomienda comprobar la seguridad de las fórmulas acabadas previo a su lanzamiento en el mercado. Los usos sugeridos en dicha fórmula no deben ser considerados como una inducción a infringir patentes existentes.


Parte F%	
Agua deionizada	4,00
Hidróxido sódico 30 %	0,46
Parte G%	
EYELISS™ (Sederma)	3,00
Parte H%	
Tween 20 (Polysorbate 20, Croda)	0,50
Fragrancia	qs

Protocolo:

Rociar el Ultrez en el agua y dejar hidratar 15 minutos. Parte B: calentar la glicerina a 60°C, disolver los conservantes. Enfriar a 40°C. Agregar la Parte C a la Parte B, homogeneizar, luego agregar la Parte B+C a la parte A con agitación a hélice. Dejar hidratar 1 hora. Agregar la Parte D, luego la Parte E a la Parte (A+B+C), homogeneizar. Neutralizar con la Parte F. Dejar hidratar 1 hora. Incorporar la Parte G, homogeneizar, luego agregar la Parte H.



EYELISS™



Formación de edema

Función:

Ayuda a prevenir y combatir las bolsas debajo de los ojos.

Definición:

Combinación de tres moléculas de activos en solución: hesperidina metil chalcona, dipéptido VW y lipopéptido Pal-GQPR.

Propiedades:

Hesperidina metil chalcona:

Disminuye la permeabilidad capilar.

Dipéptido valil-triptófano (VW):

Aumenta la circulación linfática

Lipopéptido Pal-GQPR:

Mejora la firmeza y la elasticidad, disminuye el fenómeno de inflamación.

Características:

Gracias a la asociación de estos tres activos, Eyeliss™ representa un acercamiento global para el tratamiento de los ojos hinchados actuando sobre las deficiencias fisiológicas.

Nombre INCI:

Aqua (Water) – Glycerin – Hesperidin
Methyl Chalcone – Steareth-20 –
Dipeptide-2 – Palmitoyl Tetrapeptide-7

Aplicaciones:

En todos los productos (cremas, geles, lociones,...) para el tratamiento de ojos hinchados.

Formulación:

Soluble en agua. Se incorpora a 45°C en emulsiones o a temperatura ambiente en geles.

Dosis de uso recomendada: 3 %

Patente:

WO 03/068141 – FR 2 836 042 –
EP 1 474 100 – US 7,998,493 –
JP 3730603



2-0024-06-100-00



www.sederma.com/sp

E-mail: sederma@sederma.fr

Copyright© 1994-2018 Sederma

Reservados todos los derechos.

Miembro del Grupo Internacional Croda

Tratamiento para **bolsas**

Sólo para sus **ojos**


Mejora comprobada en el

70%


de los voluntarios



Antes




Después




Antes



Después



Antes



Después

Pruebas *in vitro*

● Efecto anti-inflamatorio del péptido Pal-GQPR

Regulación de la IL6 inducida por rayos UV, producida por queratinocitos

● **-33%** con 3 % Eyeliss™

● Estimulación de drenaje con el dipéptido VW

Inhibición de la enzima Angiotensin Converting (ACE)

● **85%** con 1 % Eyeliss™

Pruebas *ex vivo*

● Efecto de la hesperidina metil chalcona sobre la permeabilidad capilar

● **-25%** de permeabilidad capilar

Estudio Clínico

20 mujeres voluntarias, de edad entre 40 y 60 años, que presentan bolsas crónicas debajo de sus ojos.

Dos aplicaciones diarias durante 56 días de un gel conteniendo 3 % de EYELISS™.

Medidas morfométricas 3D a 0, 28 y 56 días.


● Estudio morfométrico

Resultados significativos	T28	T56
Disminución significativa del espesor de la bolsa (en mm)	-0,08	-0,20
Valor máximo (en mm)	-0,40	-0,69
Número de voluntarios con una reducción en el volumen de la bolsa	65%	70%

● Autoevaluación

Suavidad alrededor del ojo	62%
Reducción en las bolsas	52%
Efecto descongestivo	52%

Principio del estudio de morfometría 3D



El software mide las distancias entre la superficie de la bolsa antes del tratamiento y la superficie de la bolsa después del mismo.

Antes



Después

