

Gel Antioxidante de Ojos con Café y Péptidos

SKU: COGACP | Fecha: 16-Sep-2026 | Versión: 2.0
Línea: Cuidado Facial | Categoría: Contorno de ojos – leave-on

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre comercial	Gel Antioxidante de Ojos con Café y Péptidos
Denominación genérica	Gel para el contorno de ojos con aceite esencial de café, péptidos biomiméticos y vitamina C liposomada
SKU	COGACP
Fabricante / Responsable	LTSH S.A. de C.V.
RFC	LTS231221IM3
Origen	Hecho en México
Domicilio	Camino Nuevo a Huixquilucan, Lote 6, Mzn 12, piso 3, Col. El Pedregal, Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52774
Sitio web	www.ltsh.com.mx
Contacto MoCRA / COFEPRIS	info@ltsh.com.mx

2. DESCRIPCIÓN GENERAL E INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Gel para el contorno de ojos de formulación propia de LTSH, sobre base de **jugo de aloe vera**. Combina **aceite esencial de café tostado**, **Matrixyl® 3000** —complejo de palmitoil tripéptido-1 y palmitoil tetrapéptido-7—, **vitamina C liposomada** y **ácido hialurónico**. Lo acompañan aceites de jojoba, caléndula, rosa mosqueta y avena coloidal, más extractos de té verde y algas y proteína de trigo hidrolizada. Textura ligera, de rápida absorción, pensada para una zona donde la piel es notablemente más delgada que en el resto del rostro.

Uso previsto	Cuidado del contorno de ojos – aplicación tópica leave-on
Zona de aplicación	Contorno de ojos, sobre el hueso orbital. No aplicar en el párpado móvil ni en la mucosa
Forma cosmética	Gel-crema de textura ligera
Presentaciones	Consultar presentaciones disponibles
Norma aplicable	NOM-141-SSA1/SCFI-2012 (México) · MoCRA – FDA (EE. UU.)
Atributos	Ayuda a mejorar la apariencia de la mirada cansada · Con aceite esencial de café y péptidos biomiméticos · Vitamina C liposomada · Textura ligera de rápida absorción · Con ácido hialurónico y pantenol · Cómodo bajo el maquillaje · INCI completo publicado

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA (NOMENCLATURA INCI)

Ingredientes enlistados en orden descendente de concentración conforme a NOM-141. Las sub-formulaciones se declaran expandidas en sus componentes.

Aqua (agua), Aloe Barbadensis Leaf Juice (jugo de aloe vera), Caprylic/Capric Triglyceride (triglicéridos de coco fraccionado), Ricinus Communis Seed Oil (aceite de ricino), Cetearyl Alcohol (and) Polysorbate 60 (alcohol cetearílico y polisorbato 60), Glyceryl Stearate (monoestearato de glicerilo), Simmondsia Chinensis Seed Oil (aceite de jojoba), Calendula Officinalis Flower Oil (aceite de caléndula), Avena Sativa Kernel Oil (aceite de avena coloidal), Camellia Sinensis Leaf Extract (extracto de té verde), Algae Extract (extracto de algas), Hydrolyzed Wheat Protein (proteína de trigo hidrolizada), Aqua (and) Ascorbic Acid (and) Lecithin (vitamina C liposomada), Palmitoyl Tripeptide-1 (and) Palmitoyl Tetrapeptide-7 (péptidos biomiméticos), Tocopheryl Acetate (acetato de tocoferilo, vitamina E), Panthenol (pantenol), Coffea Arabica Seed Oil (aceite esencial de café tostado), Propylene Glycol (and) Diazolidinyl Urea (and) Iodopropynyl Butylcarbamate (sistema conservador), Carbomer (carbómero), Rosa Rubiginosa Seed Oil (aceite de rosa mosqueta), Sodium Polyacrylate (and) Ethylhexyl Cocoate (and) PPG-3 Benzyl Ether Myristate (and)

Polysorbate 20 (poliacrilato de sodio en dispersión de ésteres), Sodium Hyaluronate (hialuronato de sodio), Rosmarinus Officinalis Leaf Oil (aceite esencial de romero), Mentha Piperita Oil (aceite esencial de menta piperita).

Las concentraciones de cada ingrediente son propiedad de LTSH S.A. de C.V. y no se publican. Todos los ingredientes se declaran en la posición que les corresponde según el orden descendente de concentración.

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Gel-crema homogéneo, ligero
Color	Beige claro (aporte natural del aceite de café)
Olor	Característico a café, con notas de romero y menta
pH (directo)	5.0 – 6.0
Punto de inflamación	Mayor a 100 °C
Solubilidad	Miscible en agua

5. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	Estable durante 18 meses en envase cerrado. La vitamina C liposomada es sensible a la luz, el calor y el oxígeno: mantener el envase bien cerrado.
Condiciones a evitar	Temperaturas superiores a 35 °C y exposición a luz solar directa
Incompatibilidades	Agentes oxidantes fuertes; iones metálicos libres, que aceleran la oxidación de la vitamina C
Descomposición	No se esperan productos de descomposición bajo condiciones normales de uso y almacenamiento

6. INFORMACIÓN SOBRE PELIGROS Y SEGURIDAD

Clasificación SGA/GHS	No peligroso para uso tópico en condiciones normales de uso
Riesgo ocular	Contiene aceites esenciales. Evitar el contacto directo con el ojo; en caso de contacto, enjuagar con abundante agua.
Sistema conservador	Diazolidinil urea e iodopropinil butilcarbamato (IPBC). IPBC: no usar en productos para niños menores de 3 años; conforme COFEPRIS ≤ 0.02 %. Libre de isotiazolinonas (MCI/MI).
Límite microbiano	≤ 500 UFC/g (COFEPRIS) · ≤ 1,000 UFC/g (ISO 17516)
Cumplimiento	NOM-141-SSA1/SCFI-2012 · MoCRA (FDA)
Seguridad microbiológica	Cumple los límites microbiológicos de COFEPRIS (menos de 1,000 UFC/g).
Tolerancia cutánea	Formulado con ingredientes de alta tolerancia cutánea aptos para uso cosmético. Al llevar aceites esenciales, se recomienda prueba previa en piel sensible.

7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y GESTIÓN DE DERRAME

Contacto ocular	Enjuagar de inmediato con abundante agua tibia durante un mínimo de 15 minutos con los párpados abiertos. Si la irritación persiste, consultar al médico.
Contacto cutáneo	Producto de uso tópico. En caso de irritación, suspender el uso y enjuagar con agua y jabón.
Ingestión accidental	No inducir el vómito. Enjuagar la boca con agua. Buscar atención médica.
Derrame	Recoger mecánicamente con material absorbente inerte. Lavar la superficie con agua y detergente. Precaución: área resbaladiza.
Eliminación	Conforme a la normativa local de residuos cosméticos.

8. INSTRUCCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS (NOM-141 / MOCRA)

Modo de empleo. Aplicar una cantidad pequeña con toques suaves sobre el hueso orbital, de fuera hacia dentro, sobre la piel limpia y seca. No estirar la piel ni aplicar sobre el párpado móvil. Usar por la mañana y por la noche. Para uso como materia prima: incorporar activos o fragancia en frío, por debajo de 40 °C, con agitación suave.

Advertencias obligatorias (NOM-141). «Uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos; si ocurre, enjuague con abundante agua. No se aplique sobre piel irritada o lastimada. Este producto contiene Iodopropynyl Butylcarbamate: no utilizar en niños menores de 3 años. Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso y consulte a su médico. Manténgase fuera del alcance de los niños.»

Frecuencia de uso	Uso diario, mañana y noche
Precaución alérgica	Contiene lecitina de soya (puede contener alérgenos derivados de la soya) y aceites esenciales con componentes alérgénicos declarables, como limoneno y linalool. Realizar prueba en zona pequeña antes del primer uso.

9. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenamiento	Conservar en envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. Preferir envases opacos.
Vida útil (cerrado)	18 meses a partir de la fecha de fabricación
PAO (una vez abierto)	6 meses
Clasificación transporte	Mercancía no peligrosa – no requiere clasificación ADR/IATA

10. CONDICIONES DE VENTA Y RESPONSABILIDAD

Este producto se comercializa a granel para uso profesional y reformulación. LTSH S.A. de C.V. garantiza la composición, la calidad y la trazabilidad del material suministrado conforme a esta ficha técnica. La responsabilidad sobre el producto terminado —incluyendo su formulación final, envasado, etiquetado, claims publicitarios, registro sanitario y adecuación al uso previsto— corresponde íntegramente al comprador. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad y estabilidad antes de incorporar este material a una formulación propia.